Klausur SS 16
Pharmakologie » Spezielle Pharmakologie

Frage 1

typische UAW Minoxidil

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Hypertrichose

(B) peptisches Ulkus

(C) Psychose

Frage 2

Febuxostat

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) hemmt die Xanthinoxidase

(B) Purin Antagonist

(C) hemmt Harnstoffbilkdung

(D) kein Hypersensitivitätssyndrom

Frage 3

GI-Komplikationen bei Diclofenac-Gabe in Kombi mit: (eine Aussage ist falsch)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Alter>70a

(B) bekannte Ulkuskrankheit

(C) Komedikation mit Steroiden

(D) Komedikation mit Metoprolol

(E) GI-Blutungen in der Anamnese

Frage 4

NYHA 3 Patient nach Stents-OP, was kriegt er?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Metoprolol, ASS, Clopidogrel, Ramipril

Frage 5

Welche Aussage über Eplerenon trifft nicht zu?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Ist ein Aldosteron-Agonist

(B) Macht weniger Gynäkomastie als ...

Frage 6

Was ist Sitagliptin

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) DPP4 Inhibitor

(B) Biguanid

(C) Insulin Sensitizer

Frage 7

Größte Hypoglykämie Risiko bei Monotherapie?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Glibenclamid

(B) Metformin

Frage 8

was stimmt nicht zu ACE-Hemmern (Ramipril)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) kann in kombination mit Glibenclamid zu Hyperglykämie führen

(B) macht Hyperkaliämie

(C) macht Kreatininerhöhung

(D) macht Hypotonie

Frage 9

55-jährige, Primäre Hypertonie ohne Vorerkrankungen, welches Medikament

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Enalapril

Frage 10

ciprofloxacin, was stimmt nicht?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) KI in Schwangerschaft

(B) Verwirrtheitszustände bei alten Patienten

(C) Archillessehnenruptur bei alten Patienten

(D) Duodenalulkus bei alten Patienten

(E) Senkung der Krampfschwelle

Frage 11

Was hilft nicht bei Asthma?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Salbutamol

(B) Metoprolol

(C) Theophyllin

(D) Montelukast

Frage 12

Was hat sich auch neben ASS als Therapie der Migräne bewährt (oder so)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Sumaptriptan

Frage 13

Welches Medikament muss bei Niereninsuffizienz nicht reduziert werden?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Furosemid

(B) Lithium

(C) Digoxin

(D) Gentamycin

(E) Tobramycin

(Lösungsvorschläge: 1:A 2:A 3:D 4:A 5:A 6:A 7:A 8:A 9:A 10:D 11:B 12:A 13:A)